

## Véto pratique

## Comment lutter contre le tartre dentaire

Comme chez l'homme, le tartre a une fâcheuse tendance à se déposer sur l'émail des dents animales. Avec une prédisposition chez certaines races, toutefois. Voici rappelées quelques règles de prévention hygiénique et alimentaire utiles à rappeler à l'officine, car en ce domaine le détartrage proprement dit reste affaire de vétérinaire.

### Mon animal a du tartre. Quels produits me conseillez-vous pour l'enlever ?

Aucun ! Si le tartre dentaire est déjà installé, seul le détartrage sous anesthésie générale par le vétérinaire peut l'éliminer. Il faut bannir toute tentative pour détacher le tartre fixé : c'est **douloureux** car le tartre s'accompagne de gingivite/parodontite ; **dangereux** (morsure liée à la douleur) ; **inefficace** (le brossage ne permet pas le retrait du tartre une fois déposé). Par contre, APRÈS le détartrage, diverses mesures de prévention doivent être instituées pour éviter la réapparition du tartre ; elles s'appliquent aussi aux animaux AVANT l'apparition du tartre et dépendent de l'animal et de son propriétaire.

### Quelle prévention pour quels animaux ?

Le tartre a tendance à se déposer plus facilement sur certaines races (chiens de petite taille), chez les animaux âgés, ou mangeant des aliments humides (boîtes *versus* croquettes ou viande qui obligent à mastiquer). Il est donc souhaitable dans ces cas d'habituer l'animal très tôt à un brossage régulier des dents avec un dentifrice spécifique et appétent (goût de viande souvent) et une brosse à dents ou un doigtier. Si l'animal n'est pas coopératif (jamais habitué au brossage/craintif/hargneux ; chat) mieux vaut opter pour des comprimés à croquer ou pour des poudres ou des liquides à mélanger aux croquettes ou à l'eau de boisson... Les lamelles à mastiquer peuvent aussi servir de « récompense ».



Examen de la dentition d'un Yorkshire Terrier par un vétérinaire

### Informez et impliquez le propriétaire

Les dents doivent être brossées au moins 2 à 3 fois par semaine pour que cela soit efficace : est-ce faisable par le propriétaire ? Si non il faut proposer d'autres méthodes. Il est essentiel d'informer les propriétaires sur les conséquences du tartre pour augmenter sa coopération : le tartre engendre une mauvaise haleine et une hypersalivation ; des infections buccodentaires qui, non traitées, peuvent se disséminer à d'autres organes (cœur, rein, os...) avec des conséquences à long terme ; il entraîne la chute des dents ; il est source de douleur parfois intense avec difficultés pour manger et dégradation de l'état de santé.

### Quels types de produits conseiller au comptoir ?

Les kits brosses à dents/doigtiers/dentifrice sont bien adaptés si l'animal est habitué jeune et a bon caractère. Par leur action mécanique, les comprimés à croquer à base de désinfectants buccodentaires et d'abrasifs luttent effica-

cement contre le dépôt de tartre et la mauvaise haleine. Ils peuvent aussi servir de friandise et sont faciles à donner. Les lamelles ou barres à mâcher ont plutôt un rôle abrasif mécanique qui retarde l'apparition du tartre. Les poudres ou liquides à mélanger à l'alimentation ou à l'eau de boisson contiennent des désinfectants qui luttent contre la mauvaise haleine et peuvent compléter l'action mécanique des aliments secs (croquette ou viande). Utilisées seules elles ralentissent plus difficilement le dépôt du tartre.

### En conclusion

Le tartre ne doit pas être pris à la légère. Il faut suivre les conseils alimentaires donnés par le vétérinaire et détartrer son animal dès qu'il en a besoin. Les méthodes de prévention doivent être instituées très tôt et poursuivies régulièrement pour retarder le développement du tartre. Toutefois elles ne peuvent l'empêcher totalement.

● Dr Vet. Florence Almosni-Le Sueur

NOUVELLE REFERENCE  
OTC  
EN PHARMACIE

**MILBEMAX™ CHEW**  
COMPRIMÉS À CROQUER POUR CHIENS

- Vermifuge large spectre
- Easy chewy technology™
- Comprimé tendre à mâcher au cœur moelleux
- Arôme naturel de poulet apprécié par les chiens<sup>(1)</sup>
- Pour les chiens à partir de 5 kg



1. Etude issue du dossier d'AMM. Study N° NAH-02-0054 - Etude réalisée, aux Etats-Unis, en 2003, sur 120 chiens de propriétaires.

**MILBEMAX™ CHEW COMPRIMÉS À CROQUER POUR CHIENS** Espèces cibles : Chiens. **Composition qualitative et quantitative en substances actives** : Un comprimé à croquer contient : milbémycine oxime 12,50 mg, praziquantel 125,00 mg. **Indications** : Chez les chiens : Traitement des infestations mixtes par les stades adultes des cestodes et des nématodes sensibles au praziquantel et à la milbémycine oxime suivants : Cestodes : *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp, *Echinococcus* spp, *Mesocostoides* spp. Nématodes : *Ancylostoma caninum*, *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Trichuris vulpis*, *Grenosoma vulpis*, *Angiostrongylus vasorum* (réduction de l'infestation par les stades parasitaires adultes immatures (L5) et adultes), *Thelazia callipaeda*. Le médicament peut être intégré ponctuellement dans un programme de prévention de la dirofilariose (*Dirofilaria immitis*), si un traitement concomitant contre des cestodes est indiqué. **Contre-indications** : Ne pas utiliser chez les chiens pesant moins de 5 kg. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients. **Effets indésirables** : Dans de très rares cas, des réactions d'hypersensibilité, des signes systémiques (tels que la léthargie), des signes neurologiques (tels que des tremblements musculaires, de l'ataxie et des convulsions), et/ou des signes gastro-intestinaux (tels que de la salivation, des vomissements, diarrhée et anorexie) ont été observés chez le chien après administration du médicament vétérinaire. **Régime de prescription et de délivrance** : Usage vétérinaire.

FRCACMIL00143 - 10/2018 - Elanco France SAS au capital de 1.708.200 € - RCS 417 350 386 Nanterre

Ligne Directe Vétérinaire  
01 55 49 35 29

Elanco France SAS  
24 Boulevard Vital Bouhot, CS 50004, 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex

Elanco